Ensayo de estímulo con desmopresina y su administración

RECOMENDACIÓN 2A

sugiere

Declaraciones de buenas prácticas

diabetes insipidus

Terapia antitrombótica

RECOMENDACIÓN 3

sugiere

Observación

Declaraciones de buenas prácticas

Cirugía mayor

RECOMENDACIÓN 4A

sugiere ≥

RECOMENDACIÓN 4B

sugiere no ≥

Observaciones

≥

Cirugía menor/procedimientos invasivos

RECOMENDACIÓN 5A

sugiere ≥ ≥

Observaciones

≥

Ginecología: Flujo menstrual abundante

RECOMENDACIÓN 6A

sugiere

RECOMENDACIÓN 6B

sugiere

Observaciones

Declaraciones de buenas prácticas

Obstetricia: Anestesia neuroaxial

RECOMENDACIÓN 7

sugiere

Obstetricia: Manejo posparto

RECOMENDACIÓN 8

sugiere

Declaraciones de buenas prácticas

Valores y preferencias

		≥	≥	
		≥	≥	

$ α

$

Interpretación de recomendaciones sólidas y condicionales

sugiere

Cuadro 3

Implicaciones para	Recomendación sólida	Recomendación condicional

Revisión de documentos

Blood Advances

Cómo utilizar estas guías

Recomendaciones

Profilaxis

Otros criterios y consideraciones EtD

Cuadro 4

Option de concentré de FW	Descripción
	$
	$
	$

$

Ensayo de estímulo con desmopresina y su administración

de estímulo con desmopresina y elegir un tratamiento para las hemorragias con base en los resultados

RECOMENDACIÓN 2A

sugiere

RECOMENDACIÓN 2B

sugiere no

Observaciones

≥

Declaraciones de buenas prácticas

diabetes insipidus

Resumen de las pruebas científicas

Beneficios

Otros criterios y consideraciones EtD

Conclusiones y necesidades de investigación para estas recomendaciones

Cuadro 5

Dominio	Descripción
	≥

Observación

Declaraciones de buenas prácticas

Resumen de las pruebas científicas

Beneficios, perjuicios y carga

Cirugía mayor

En el caso de pacientes con EVW que se someterán a cirugía mayor, ¿debería el nivel de FVIII mantenerse en ≥
actividad del FVW mantenerse en ≥

RECOMENDACIÓN 4A

sugiere ≥

RECOMENDACIÓN 4B

sugiere ≥

Observaciones

≥

Resumen de las pruebas científicas

Conclusiones y necesidades de investigación para estas recomendaciones

≥

≥

≥

≥

≥

≥

$

Cirugía menor/procedimientos invasivos

En el caso de pacientes con EVW que se someterán a cirugías menores o procedimientos invasivos menores, ¿debería el nivel de FVW incrementarse a ≥

una terapia combinada incrementando el nivel de FVW a ≥

RECOMENDACIÓN 5A

sugiere ≥

≥

RECOMENDACIÓN 5B

sugiere

≥

Observaciones

≥

Resumen de las pruebas científicas

$

Bene f cios, perjuicios y carga

≥

Conclusiones y necesidades de investigación para estas recomendaciones

Ginecología: Flujo menstrual abundante

Resumen de las pruebas científicas

Beneficios, perjuicios y carga

Obstetricia: Anestesia neuroaxial

¿debería administrarse concentrado de FVW para lograr un nivel de actividad del FVW de 0.50 a 1.50

RECOMENDACIÓN 7

sugiere

Observaciones

Resumen de las pruebas científicas

Beneficios, efectos nefastes et contraintes.

Otros criterios y consideraciones EtD

Conclusiones y necesidades de investigación para esta recomendación

Obstetricia: Manejo posparto

RECOMENDACIÓN 8

Declaraciones de buenas prácticas

Resumen de las pruebas científicas

$

Beneficios, perjuicios y carga

Otros criterios y consideraciones EtD

Conclusiones y necesidades de investigación para esta recomendación

Obstetricia: Anestesia

Comentarios de terceros y novedades sobre estas guías

Agradecimientos

The Diagnosis, Evaluation, and Management of von Willebrand Disease

Autoría