


Recomendaciones de las guías de ASH, ISTH, NHF, FMH para el tratamiento de la enfermedad de Von Willebrand (EVW)



Qué abarcan

- Recomendaciones basadas en pruebas científicas para el tratamiento de la EVW en el contexto de cirugías mayores y menores, pruebas durante procedimientos invasivos, uso de desmopresina, y uso profiláctico de concentrado de factor Von Willebrand (FVW).



Por qué son importantes

- La EVW es el trastorno de la coagulación hereditario más común.
- Actualmente hay una gran variabilidad en la práctica clínica aplicada al tratamiento de la EVW debido a la falta de pruebas científicas de certeza elevada para orientar la toma de decisiones.
- Hay múltiples subtipos de la EVW que requieren tratamiento individualizado con base en el diagnóstico específico, así como una gama de síntomas y múltiples terapias disponibles para su tratamiento. Lo más conveniente tanto para el médico como para el paciente es contar con orientación para correlacionar el trastorno con el tratamiento adecuado.

A quiénes involucra

- **Hematólogos, médicos generales, internistas, ginecoobstetras, cirujanos, anesthesiólogos, dentistas (odontólogos)**

Las guías ofrecen recomendaciones para la toma de decisiones compartida, cuyo objetivo es incrementar el acceso a la atención de calidad para personas que viven con la EVW.

- **Personas con EVW**

Debido a que existe una amplia gama de síntomas y muchas terapias diferentes para el tratamiento de la EVW, son necesarias recomendaciones basadas en pruebas científicas a fin de mejorar el acceso a tratamientos adecuados y facilitar la terapia individualizada.



Cuáles son los aspectos relevantes

- Las guías hacen recomendaciones clave para abordar una amplia gama de manifestaciones de la EVW y las mejores prácticas para su tratamiento en entornos médicos o de otro tipo; entre ellas, las siguientes:

Profilaxis para hemorragias recurrentes frecuentes.

Pruebas con desmopresina para determinar la terapia.

Uso de agentes antiplaquetarios y terapia anticoagulante.

Lograr niveles ideales de actividad del FVW y del factor VIII para cirugías mayores.

Estrategias para reducir hemorragias durante cirugías menores o procedimientos invasivos.

Opciones de tratamiento para sangrado menstrual abundante.

Tratamiento de la EVW en el contexto de anestesia epidural durante el trabajo de parto y el nacimiento.

Tratamiento en el entorno posparto.

Número total de recomendaciones del panel: 12

Referencia: Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021;5(1):301-325.

Para obtener más información sobre las Guías de ASH, ISTH, NHF, FMH para la enfermedad de Von Willebrand visite <https://ashpublications.org/bloodadvances/pages/vwd-guidelines>.